*High Alert drugs*
*โรงพยาบาลอ่างทอง*

☐ **Dopamine ( Injection 250 mg / 10 ml)**
☐ **Dobutamine (Injection 250 mg/20 ml)**
☐ **Adrenaline ( กรณี Refractory Hypotension ที่สั่งให้ยาแบบ continuous IV infusion)**

**ชื่อ-สกุล.....HN…….AN……..ward……**

| **พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม** | **เหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์** |
|---|---|
| - ติดตาม BP (Blood Pressure) และ HR (Heart rate)ทุก 15 – 30 นาที ในระยะแรก เพื่อปรับขนาดยาจนกว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ หลังจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกว่าจะหยุดให้ยา<br>- In profound shock (วัด BP และ/หรือ จับชีพจร ไม่ได้) ติดตาม urine output ทุก 1 ชม. จนปกติ | 1. BP < 90/60 mmHg เมื่อให้ยาขนาด สูงสุดแล้ว<br>2. BP > 140/90 mmHg เมื่อให้ยาขนาดต่ำสุดแล้ว<br>3. HR เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ของ baseline ของ ผู้ป่วย<br>4. Urine output < 30 ml/h หรือ < 0.5 ml/kg/h |

| **วัน เดือน ปี** | **เวลา** | **อัตราการให้ยา (μd/min,ml/hr)** | **BP (mmHg)** | **HR** | **RR** | **Urine output** | **ระบุเหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ การดำเนินการหลังรายงานแพทย์** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**มิถุนายน 52**