


High Alert drugs

โรงพยาบาลอ่างทอง

- Fondaparinux 2.5 mg/ 0.5 ml (Arixtra®)
- Enoxaparin 40 mg/0.4 ml (Clexane®)
- Nadroparin 3800 IU/0.4 ml (Fraxiparine®)

ชื่อ-สกุล.....HN.....AN.....WARD.....
 แพทย์ผู้รักษา.....โรคหรือสาเหตุที่ใช้.....



วิธีการฉีดยา

1. จัดผู้ป่วยอยู่ในท่านอนราบ ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง ทำการฉีดยา Arixtra / Clexane โดยไม่ต้องไล่ฟองอากาศ จับผิวหนังขึ้นเบาๆ ให้เป็นลำ โดยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ร่วมกับนิ้วที่เหลือของมือข้างที่ไม่ถนัด แล้วใช้มือข้างที่ถนัดจับหลอดฉีดยา แทะเข็มไปในแนวตั้งฉากกับผิวหนัง เมื่อฉีดยาเสร็จแล้วใช้สำลีกดที่ฉีดยาไว้ประมาณ 30 วินาที ห้ามคลึงหรือขยี้
2. ฉีดยาตามตำแหน่งหมายเลขตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้
3. ให้ผู้ฉีดยาเซ็นชื่อบอกตำแหน่งที่ฉีดและประเมินบริเวณที่ฉีดยา
4. ติดตาม Adverse Drug Reactions (ADR) ที่อาจเกิดขึ้น

ว/ด/ป	ขนาดให้ยา	เวลา.....	เวลา.....	ADR * (กรุณาระบุเหตุการณ์ที่เกิด)	เหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ - ผู้ป่วยเกิด ADR - Platelet < 100,000
		ตำแหน่ง/ ผู้ฉีด	ตำแหน่ง/ ผู้ฉีด		
	/...../.....		
	/...../.....		
	/...../.....		
	/...../.....		
	/...../.....		
	/...../.....		

* bleeding เช่น เลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา จำเลือดบริเวณผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือดหรือถ่ายดำ เลือดกำเดาไหล ไอเป็นเลือด

(Major bleeding was defined as bleeding resulting in a hemoglobin drop of ≥ 3 g/dL, the requirement of two or more units of packed RBCs given within 48 hours or intraocular, retroperitoneal, or intracranial hemorrhage.)

ADR อื่นๆ เช่น ท้องผูก เกร็ดเลือดต่ำ ภาวะถูกพรุณ