*High Alert drugs*
*โรงพยาบาลอ่างทอง*

# Nicardipine injection (Cardipine) 10mg/ml

**ชื่อ-สกุล.....HN…….AN……..ward……**

| **พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม** | **เหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์** |
|---|---|
| ติดตาม BP และ HR ทุก 15 นาที ในระยะแรกเพื่อปรับขนาดยาจนกว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ หลังจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกว่าจะหยุดให้ยา | 1. BP < 90/60 mmHg เมื่อให้ยาขนาดต่ำสุดแล้ว<br>2. BP > 140/90 mmHg เมื่อให้ยาขนาดสูงสุดแล้ว |

| **วัน เดือน ปี** | **เวลา** | **อัตราการให้ยา** (μd/min,ml/hr) | **BP (mmHg)** | **HR (ครั้ง/นาที)** | **RR (ครั้ง/นาที)** | **ระบุเหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ การดำเนินการหลังรายงานแพทย์** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |