High Alert drugs
โรงพยาบาลอ่างทอง

Nitroglycerine injection 25 mg in 5 ml

เจือจางใน D5W หรือ NSS ที่บรรจุในภาชนะที่เป็นแก้ว

หรือพลาสติกชนิด Polyethylene – PE เท่านั้น

ชื่อ-สกุล.....HN…….AN……..ward……

พารามิเตอร์ที่ต้องติดตาม	**เหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์**
ติดตาม BP และ HR ทุก 3-5 นาที ในระยะแรกเพื่อปรับขนาดยาจนกว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ หลังจากนั้นติดตามทุก 1 ชม. จนกว่าจะหยุดให้ยา	1. BP < 90/60 mmHg เมื่อให้ยาขนาดต่ำสุดแล้ว 2. BP > 140/90 mmHg เมื่อให้ยาขนาดสูงสุดแล้ว 3. HR น้อยกว่า 60 ครั้งต่อนาที 4. HR เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ของ baseline ของ ผู้ป่วย

วัน เดือน ปี	**เวลา**	**อัตราการให้ยา** (μd/min,ml/hr)	**BP (mmHg)**	**HR (ครั้ง/นาที)**	**RR (ครั้ง/นาที)**	**ระบุเหตุการณ์ที่ต้องรายงานแพทย์ การดำเนินการหลังรายงานแพทย์**